

ESTUDIO CIS nº 2138
FICHA TÉCNICA
MUESTRA DISEÑADA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Aragón.

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Teórica: 1.100 entrevistas distribuidas de la siguiente forma: Huesca, 300; Teruel, 300; Zaragoza, 500. La muestra tiene representatividad provincial.

Real: 1.094 entrevistas distribuidas por provincias, de la siguiente forma: Huesca, 297; Teruel, 300 y Zaragoza, 497 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Se han hecho dos módulos: uno de 300 entrevistas, y otro de 500. Se han aplicado en función del tamaño de la provincia.

Ponderación:

Para tratar la muestra en su conjunto es necesario aplicar los siguientes coeficientes de ponderación¹: Huesca, 0,651; Teruel, 0,449; Zaragoza, 1,541.

Puntos de muestreo:

54 municipios. La distribución provincial es la siguiente: Huesca 20 municipios, Teruel 21 municipios, Zaragoza 13 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error de $\pm 3,02$, y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

2 de marzo a 17 de marzo de 1995.

¹ Los coeficientes de ponderación se han calculado sobre la muestra real.

ESTUDIO CIS nº 2138
FICHA TÉCNICA
- Provincia de Zaragoza -

Ámbito:

Provincia de Zaragoza.

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Teórica: 500 entrevistas.

Real: 497 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de muestreo:

13 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error de $\pm 4,48$, y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

2 de marzo a 17 de marzo de 1995.