

**ESTUDIO CIS nº 2207**

**FICHA TÉCNICA**

**MUESTRA GLOBAL**

**Ámbito:**

Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

**Universo:**

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

**Tamaño de la muestra:**

6.650 entrevistas divididas en dos submuestras:

**NACIONAL:** Excluida Andalucía: 4.150 entrevistas.

**Diseñada:** 4.150

**Realizada:** 4.145

**ANDALUCÍA:** 2.500 entrevistas.

**Diseñada:** 2.500

**Realizada:** 2.497

## **MUESTRA NACIONAL**

### **Afijación:**

Proporcional.

### **Ponderación:**

Para poder tratar las submuestras conjuntamente hay que aplicar los siguientes coeficientes<sup>1</sup>:

- España sin Andalucía: 1.
- Andalucía: Almería 0,243; Cádiz 0,368; Córdoba 0,312; Granada 0,327; Huelva 0,238; Jaén 0,293; Málaga 0,372; Sevilla 0,456.

### **Puntos de muestreo:**

48 provincias y 311 municipios.

### **Procedimiento de muestreo:**

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en siete categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

### **Error muestral:**

Para un nivel de confianza de 95,5% (2 sigmas) y  $P=Q$ , el error es de  $\pm 1,41$  para el conjunto de la muestra nacional.

### **Fecha de realización:**

12-21 de febrero de 1996.

---

<sup>1</sup> Los coeficientes de ponderación han sido calculados sobre la muestra real.

## **MUESTRA DE ANDALUCÍA**

### **Afijación:**

No proporcional. Las 2.500 entrevistas se han distribuido proporcionalmente a la raíz cuadrada de la población de cada provincia. El resultado ha sido el siguiente:

Almería 230; Cádiz 350; Córdoba 301; Granada 308; Huelva 229; Jaén 276; Málaga 370; Sevilla 436.

### **Ponderación:**

Para devolver la proporcionalidad a la muestra y, en consecuencia, poder tratar las distintas provincias conjuntamente hay que aplicar los siguientes coeficientes:

Almería 0,715; Cádiz 1,083; Córdoba 0,918; Granada 0,963; Huelva 0,702; Jaén 0,860; Málaga 1,093; Sevilla 1,333.

### **Puntos de muestreo:**

8 provincias y 113 municipios.

### **Procedimiento de muestreo:**

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 8 provincias con el tamaño de hábitat, dividido en siete categorías: menos de 2.00 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

### **Error muestral:**

Para un nivel de confianza de 95,5% (2 sigmas) y  $P=Q$ , el error es de  $\pm 2$  para el conjunto de la muestra de Andalucía.

### **Fecha de realización:**

12-21 de febrero de 1996.